



# Piqûres d'hyménoptères

## Les risques et les mesures de prévention

Fiche à destination des employeurs

Parlez-en avec votre médecin du travail ou son équipe

## Connaître les situations à risque

### Les métiers à risque

- > agriculteurs,
- > jardiniers, paysagistes,
- > élagueurs,
- > personnels des eaux et forêts,
- > professionnels des ponts et chaussée,
- > ouvriers des chantiers de construction ou de commerce en extérieur.

### Les principaux hyménoptères



Abeille domestique  
(*Apis mellifera*)



Bourdon terrestre  
(*Bombus terrestris*)



Guêpe commune  
(*Vespula vulgaris*)



Frelon européen  
(*Vespa crabro*)



Frelon asiatique  
(*Vespa velutina*)

## Les impacts sur la santé

Les piqûres d'hyménoptères peuvent provoquer trois types de réaction :

### Réaction locale

La plus fréquente, accompagnée :

- > d'une **rougeur locale**,
- > d'un **gonflement**,
- > d'une **légère induration**,
- > parfois de **démangeaisons**.

Une piqûre dans la bouche ou dans gorge peut gonfler au point d'entraîner un risque d'étouffement.

### Réaction toxique

En cas de **piqûres multiples**, à la réaction locale s'ajoutent des **signes généraux** :

- > vomissement,
- > diarrhée,
- > maux de tête,
- > chute de tension,
- > plus rarement convulsion et perte de connaissance.

### Réaction allergique

**Une seule piqûre suffit à la déclencher et entraîner la mort de la victime.**

Le choc anaphylactique peut entraîner l'obstruction des voies respiratoires et le choc cardiovasculaire.



Largement sous-estimés, le choc toxique ou le choc anaphylactique aux venins d'hyménoptères sont pourtant responsables de 30 décès par an en France.

### Conduite à tenir en cas de piqûre et mesures de prévention



#### En cas de piqûre

- > Identifier l'insecte.
- > Si piqûre d'abeille : retirer rapidement le dard.
- > Enlever les bagues en cas de piqûre à la main.
- > Bien désinfecter à l'eau et au savon, puis appliquer une solution antiseptique.
- > Consulter un médecin si la réaction locale (gonflement, douleur, rougeur) s'aggrave et en cas de piqûre dans la gorge ou la bouche.



#### En cas de réaction allergique

Appeler le 15 ou le 112 pour un transport d'urgence à l'hôpital.


Coucher la victime et surélever ses jambes.

En cas de piqûres multiples (plus de 20), une surveillance à l'hôpital est conseillée.



#### Les mesures de prévention à mettre en place par l'employeur

- > Inspecter les zones d'espaces verts avant intervention pour repérer la présence éventuelle de nids.
- > Ne pas intervenir en présence de nids, faire appel à un professionnel.
- > Former les agents au secourisme et élaborer une procédure en cas d'accident.
- > Éviter le travail isolé.
- > Inclure dans le Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) le danger des hyménoptères.
- > Avoir une trousse à pharmacie et un moyen de communication.



#### La conduite à adopter à communiquer aux salariés

- > Porter des vêtements couvrants de couleur clair.
- > Porter des chaussures ou bottes de sécurité et des vêtements longs.
- > Porter des gants résistant à un haut niveau de perforation.



#### Pour les personnes allergiques

> Informer collègues et employeur d'une allergie aux hyménoptères.

> Solliciter le médecin du travail.

> Avoir sa propre trousse à pharmacie selon les recommandations du corps médical.

Parlez-en avec votre médecin du travail ou son équipe